



Uyluk Bölgesinde Yoğunlaşan Suçiçeği Döküntüsü

Varicella Rash Concentrated in the Thigh Area

Ergin Çiftçi¹, Erdal İnce¹

¹ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara, Türkiye



Dokuz yaşında kız hasta, ciltte döküntü yakınmasıyla getirildi. Hastanın muayenesinde bütün vücutta yaygın papüloveziküller lezyonları vardı. Lezyonlar özellikle sağ uyluk bölgesinde yoğunlaşmıştı. Hastanın yakın zamanda sağ uyluk ön ve dış kısmında ikinci derece yanık oluşmuş, bu bölge sargı ile geniş biçimde kapatılmıştı. Hastaya suçiçeği tanısı konuldu. İzlemede hastanın bütün döküntüleri kurutlanarak sorunsuz olarak iyileşti.

Suçiçeği, varisella-zoster virüsüne bağlı gelişen döküntülü bir hastalıktır. Hastalarda görülen lezyon sayısı kişiye göre farklılık gösterir. Yaş, ev maruziyeti, bağışıklık sisteminde baskılanma gibi durumlar hastalığın şiddetini artırabilir. Suçiçeğinde lezyonlar gövde ve yüzde yoğun, ekstremitelerde ise daha seyrek-tir. Ancak yanık, önceden var olan cilt hastalığı ve travma gibi bazı bölgesel nedenlerle ilgili bölgede yoğunlaşan suçiçeği lezyonları görülebilir. Bölgesel basınç ve sıcaklık artışı gibi nedenlerle deride damar genişlemesi, kanlanma artışı, böylece daha fazla virüsün deriye ulaşması lezyonların bu bölgelerde yoğunlaşmasını açıklayabilir. Lezyonların dermatom dışına da taşıyor olması yaygın herpes zosterden ayrılması açısından önem taşır.

Yazışma Adresi / Correspondence Address:

Ergin Çiftçi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara-Türkiye

E-mail: erginciftci@gmail.com

©Telif Hakkı 2018
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği -Makale metnine
www.cocukenfeksiyon.org web sayfasından ulaşılabilir.

©Copyright 2018 by Pediatric
Infectious Diseases Society -Available online at
www.cocukenfeksiyon.org