



Alın Bölgesindeki Kütanöz Şarbona Eşlik Eden Periorbital Ödem

Cutaneous Anthrax on Forehead Region Accompanied with Periorbital Edema

Osman Yeşilbaş¹, Tuncay Özer², Gülşen Akkoç³

¹ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, Van, Türkiye

² Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Van, Türkiye

³ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Van, Türkiye

Makale atfı: Yeşilbaş O, Özer T, Akkoç G. Alın bölgesindeki kütanöz şarbona eşlik eden periorbital ödem. *J Pediatr Inf* 2018;12(3):121

Öncesinde bilinen bir hastalığı olmayan 14 yaşındaki kız hasta sağ alın bölgesinde olan yara ile her iki göz etrafında oluşan şişlik nedeni ile acil servise başvurdu. Alın bölgesindeki yaranın yaklaşık bir hafta önce sivilce şeklinde kaşıntılı bir şekilde başladığı ve büyüdüğü, göz etrafındaki şişliğin ise son üç gündür ortaya çıktığı belirtildi. Fizik muayenesinde; alının sağ tarafında, saçlı deri komşuluğunda 2 x 2 cm boyutunda, çevresi eritemli, ülserle, siyah kabuklu ve ağrısız yara ile sağda daha belirgin olmak üzere iki taraflı periorbital ödem gözlemlendi (Resim 1). Diğer sistemik muayenesi ve kan tetkikleri normaldi. Ailesi hayvancılıkla uğraşan, hayvan teması olan ve yaşadıkları köyde şarbon tanısı alan olguların olduğu belirtilen hastanın yarasının özellikleri de şarbon ile uyumlu olduğu için hastaya şarbon tedavisi başlandı (intravenöz siprofloksasin). Periorbital ödem için intravenöz metilprednizolon ile feniramin uygulandı. Olası preseptal ve orbital selülit dışlamak için çekilen kontrastlı bilgisayarlı tomografisi göz etrafındaki ödem dışında normaldi. Alın bölgesindeki yaradan alınan sürüntü örneğinde *Bacillus anthracis* polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) pozitif saptanması üzerine kütanöz şarbon tanısı kesinleştirildi. On günlük intravenöz antibiyotik tedavisi sonrası yarası küçüldü ve üzerinde tamamen siyah renkli kabuk oluştu. Periorbital ödemi de tamamen gerileyen hasta oral siprofloksasin ile taburcu edildi ve tedavisi 14 güne tamamlandı.



Resim 1. Alının sağ tarafında, saçlı deri komşuluğunda 2 x 2 cm boyutunda, çevresi eritemli, ülserle, siyah kabuklu ve ağrısız yara ile sağda daha belirgin olmak üzere iki taraflı periorbital ödem.

Geliş Tarihi: 20.09.2018

Kabul Tarihi: 09.10.2018

Yazışma Adresi / Correspondence Address:

Osman Yeşilbaş

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, Van-Türkiye

E-mail: drosmanyesilbas@gmail.com

©Telif Hakkı 2018
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği -Makale metnine
www.cocukenfeksiyon.org web sayfasından ulaşılabilir.

©Copyright 2018 by Pediatric
Infectious Diseases Society -Available online at
www.cocukenfeksiyon.org